



DEPARTAMENTO DE SALUD DE MIAMI-DADE: LLAME LAS 24 HORAS AL: (305) 470-5660. FAX (305)470-5533



ÁNTRAX

DESCRIPCIÓN GENERAL : Enfermedad bacteriana de los mamíferos, causada por *Bacillus anthracis*, que puede usarse con propósitos bio-terroristas

CÓMO SE PUEDE CONTAGIAR

No hay transmisión de persona a persona. Usted puede contraer ántrax respiratorio al inhalar esporas de ántrax de productos animales infectados (p. ej. lana), o en una dispersión terrorista

TIEMPO ENTRE LA EXPOSICIÓN Y LOS SÍNTOMAS

El período de incubación para el ántrax inhalatorio es de 1 a 7 días. En algunos casos, los síntomas pueden tardar hasta 60 días en aparecer.

SÍNTOMAS MAYORES

El ántrax inhalatorio se presenta usualmente en forma de un resfriado, con dolor de garganta, náusea, fiebre leve, y dolores musculares seguidos de tos, molestias en el pecho, dificultad para respirar, y cansancio. Puede haber molestias del estómago.

PREVENCIÓN DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN

Se requiere un curso de 60 días de antibióticos tales como ciprofloxacina, doxiciclina, amoxicilina, or penicilina. Asegúrese de informar a su doctor qué medicamentos está tomando.

INFORMACIÓN SOBRE LA PROFILAXIS

ANTIBIÓTICO	CLASE	INSTRUCCIONES PARA TOMARLO	INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS	EFECTOS COLATERALES	PRECAUCIONES
Ciprofloxacina (CIPRO TM 500 mg)	Quinolona	Tome este antibiótico como se prescribe: una tableta por la boca, 2 veces al día. Tómelo hasta terminarlo, a menos que su doctor le diga que lo suspenda. Tome mucha agua mientras esté tomando Cipro [®] . Es mejor si lo toma 2 horas después de una comida. <i>¡No tome 2 dosis al mismo tiempo!</i>	No tome este antibiótico si usted ha tenido una reacción alérgica a ciprofloxacina, u otro antibiótico de la familia de las quinolonas tal como norfloxacina (Noroxin [®]), ofloxacina (Floxin [®]), o ácido nalidíxico (NegGram [®])	Puede haber diarrea leve, dolor de estómago, mareo. Busque atención médica inmediata si tiene: latidos rápidos del corazón, brote o ronchas en la piel, hinchazón de la cara, la garganta o los labios; dificultad para respirar o falta de aire; convulsiones o ataques epilépticos, o diarrea severa	Informe al trabajador (a) de salud si usted está embarazada, está amamantando, tiene epilepsia o tiene enfermedad de los riñones. Evite conducir u operar maquinaria hasta que sepa cómo lo (a) va a afectar el antibiótico. Use bloqueador solar para evitar quemaduras de la piel por los
Doxiciclina (100 mg)	Tetraciclina	Tome este antibiótico como se prescribe: una tableta por la boca, 2 veces al día. Tómelo hasta terminarlo, a menos que su doctor le diga que lo suspenda. El alimento le puede ayudar a evitar el malestar del estómago. <i>¡No tome 2 dosis al mismo tiempo!</i>	No tome este antibiótico si usted ha tenido una reacción alérgica a cualquier tetraciclina. No tome las siguientes medicinas hasta 2 horas después de haber tomado doxiciclina: antiácidos tales como Maalox o Milanta; suplementos de calcio o hierro, colestiramina (Questran [®]), o colestipol (Colestid [®])	Puede haber diarrea, malestar del estómago, náusea, sensibilidad aumentada a la luz solar, o picazón. Busque atención médica inmediata si tiene: latidos rápidos del corazón, brote o ronchas en la piel, o picazón; le silba el pecho, o tiene dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios, o garganta..	Informe al trabajador (a) de salud si usted está o podría estar embarazada, o si está amamantando. Use bloqueador solar para evitar quemaduras de la piel por los rayos del sol.
Amoxicilina 250-mg capsulas o 250mg/5ml suspensión	Antibiótico	Tome este antibiótico como se prescribe: 3 veces al día o cada 8 horas, según las instrucciones del trabajador de la salud. Para la suspensión oral, agite bien antes de usar; manténgala refrigerada. Tome su antibiótico hasta terminarlo, a menos que su doctor le diga que lo suspenda. El alimento o la leche le pueden ayudar a evitar el malestar del estómago. <i>¡No tome 2 dosis al mismo tiempo!</i>	No tome amoxicilina si ha tenido una reacción alérgica a amoxicilina, penicilina, o a una cefalosporina tal como Keflex [®] o Ceclor [®] . Informe a su doctor si usted está tomando Probenecid. Use un método de control prenatal distinto a las píldoras: pueden no ser muy efectivas cuando se mezclan con amoxicilina.	Puede haber diarrea leve, náusea, molestias del estómago, picazón en el cuerpo.. Busque atención médica inmediata si tiene: latidos rápidos del corazón, brote o ronchas en la piel, o picazón; le silba el pecho, o tiene dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios, o garganta, o	Este antibiótico se considera seguro durante el embarazo y durante la lactancia.

Si usted esta tomando cualquier otro medicamento o esta embarazada, asegurese de informar a su doctor del tipo de medicina que acaba de recibir. El/Ella le aconsejara sobre las posibles interacciones de los medicamentos.